

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

## AUVERGNE ET LIMOUSIN

### SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Cité Administrative, rue Pallasier

63034 Clermont Ferrand Cedex

☎ (73) 92-42-68

BULLETIN TECHNIQUE  
PUBLICATION PERIODIQUE

## Edition générale

**N°11**

Le 24 Avril 1984

### VIGNE

Les conditions climatiques exceptionnelles de ces derniers jours ont provoqué un développement rapide de la végétation.

La vigne atteint le stade C en toutes situations. En zone plus précoce, certains bourgeons sont au stade D.

#### EXCORIOSE

*Dans les parcelles atteintes par cette même maladie où un traitement avec un produit à base d'arsénite de soude n'a pas été réalisé ou réalisé dans de mauvaises conditions, il y a lieu de prévoir la mise en place de la lutte de printemps dès réception de ce bulletin.*

Celle-ci est basée sur deux applications successives :

- la première au stade C/D ;
- la seconde au stade D/E.


Pour les produits utilisables, consulter le tableau au verso.

- Eviter l'emploi de produits à base de Métalaxyl et d'Ofuran en raison des problèmes de résistance.
- Selon les résultats des travaux de l'I.N.R.A., une seule application des produits à base de Phoséthyl Al (MIKAL - RHODAX) peut être efficace si elle est réalisée dès que les premiers bourgeons sont au stade D.


#### NOCTUELLES

Des dégâts souvent localisés sont notés chaque année. Des bourgeons sont rongés ou évidés, les jeunes pousses dévorées.

Dans les parcelles habituellement atteintes, surveiller la végétation et intervenir si nécessaire.



Bourgeon dans le coton



Pointe verte



Sortie des feuilles



Feuilles étalées

## PRODUITS UTILISABLES CONTRE L'EXCORIOSE

- dichlofluamide à 200 g m.a./hl.....	EUPARENE	- cymoxanil + cuivre + zinèbe.....	CUPROFIX CZ activé
- dithianon à 50 g m.a./hl.....	DELAN	- cymoxanil + cuivre + zinèbe + folpel..	CUPROFIX F activé
- folpel à 150 g m.a./hl.....	Nombreuses spécialités	- cymoxanil + folpel + captafol.....	SYGAN, SYGAN L
- mancozèbe à 280 g m.a./hl.....	DITHANE M 45, DITHANE LF, SANDOZEBE, KORZEBE	- cymoxanil + folpel.....	ANTEOR
- métirame de zinc à 320 g m.a./hl.....	POLYRAM	- cymoxanil + folpel + cuivre.....	ANTEOR C
- propinèbe à 280 g m.a./hl.....	ANTRACOL, ANTRACOL 6	- cymoxanil + mancozèbe.....	FULVAX, REMILTINE, REMILTINE S
- folpel + captafol.....	MYCODIFOL F, MYCODIFOL liquide	- cymoxanil + mancozèbe + folpel.....	REMILTINE F
- folpel + captafol + captane.....	CODICAP	- cymoxanil + zinèbe + folpel.....	NOVOFIX F activé
- folpel + mancozèbe.....	MANCOFOL	- phoséthyl Al + folpel.....	MIKAL
- folpel + thirame + carbendazime.....	B T F	- phoséthyl Al + mancozèbe.....	RHODAX
- cymoxanil + cuivre + captafol.....	SYPHAL, SYPHAL L	- soufre à 1 000 g/hl.....	THIOVIT

## ARBRES FRUITIERS

### TAVELURE DU POMMIER ET DU POIRIER

Compte-tenu des conditions climatiques sèches, il n'y a pas eu de projections d'ascospores dans la nature;

*Il convient de rester vigilant, des projections importantes pouvant se produire dès la prochaine pluie.*

### OIDIUM DU POMMIER

La lutte contre cette maladie ne doit pas être négligée.

L'oïdium peut se développer même par beau temps à la faveur d'hygrométrie élevée.

### PUCERONS - CHENILLES

La présence de ces insectes est notée en vergers, jeunes ou âgés, en différents secteurs.

Une application insecticide est à prévoir dans les prochains jours, avant la floraison.

### Protection des abeilles

Pendant la période de floraison, il convient de limiter les applications insecticides. S'assurer que le produit choisi est classé :

"Non dangereux pour les abeilles"

Respecter strictement les doses indiquées (éviter tout surdosage) et traiter dans la mesure du possible en dehors des heures de butinage

### ACARIENS

Aucune éclosion d'oeufs d'hiver n'a encore été notée.  
Il est trop tôt pour intervenir.

### PSYLLES

Les éclosions d'oeufs d'hiver sont en cours.  
Les poiriers étant au stade F (floraison), attendre la fin floraison pour intervenir si un traitement hivernal a été réalisé.  
Si une application est envisagée actuellement, choisir un produit non dangereux pour les abeilles et traiter en dehors des heures chaudes de la journée.